



## Línea FEM y Test

Test de antígenos para la detección rápida de la vaginitis

## Línea FEM y Test

Inmediatez, Practicidad, Seguridad

Una prueba rápida y sencilla.  
Consulta a tu ginecólogo.



[www.nimgenetics.com](http://www.nimgenetics.com)

(+ 34) 91 037 83 54 · [info@nimgenetics.com](mailto:info@nimgenetics.com)

CAT-39; Rev01; 11/02/2022



## Línea FEM y Test

Test de antígenos  
para la detección rápida de la

**VAGINITIS**



# ¿Qué es el Test de Vaginitis de NIMGenetics?

Es el **primer test de antígenos** para la detección cualitativa de *Gardnerella vaginalis*, *Candida albicans* y *Trichomonas vaginalis*, principales agentes causantes de los tipos más comunes de vaginitis, en muestras de hisopos vaginales.

## ¿A quién va dirigido?



Mujeres de cualquier edad que manifiesten un cuadro clínico compatible con vaginitis, especialmente casos que presenten una sintomatología compleja.

## ¿Cómo?



A través de una muestra de cepillado de la mucosidad vaginal tomada en consulta, lo que ofrece mínimo disconfort y máxima flexibilidad en la toma.

## ¿En qué condiciones?



La toma de la muestra y el análisis pueden realizarse a temperatura ambiente en consulta.

## ¿Cuánto tardan los resultados?



Un máximo de 15 minutos.

## ¿Por qué nuestro Test?



Estudio validado clínicamente y marcado CE-IVD, con una sensibilidad y especificidad media >99% para cada uno de los microorganismos detectados.



## Línea FEM y Test


### La importancia de un correcto diagnóstico diferencial

La vaginitis infecciosa puede deberse a la infección causada por diferentes agentes, presentando cuadros sintomatológicos característicos, pero al mismo tiempo muy solapantes entre sí.

Esto conlleva, en la práctica clínica, una mayor dificultad a la hora de identificar el agente/s etiológico/s y los factores desencadenantes de la infección, y por ende, la elección de tratamiento.

### Distribución de los principales agentes infecciosos causantes de vaginitis

La **vaginosis bacteriana** es responsable del 40-50% de las **infecciones vaginales**, seguida por la **candidiasis** (20-25%) y la **tricomoniasis** (15-20%).



- Vaginitis infecciosas por *Gardnerella vaginalis*, *Trichomonas vaginalis* y *Candida albicans*.
- Vaginitis infecciosas por otros agentes.

- Vaginosis bacteriana
- Candidiasis
- Tricomoniasis

### Permite la detección de infecciones mixtas

*“En torno al 75% de las mujeres experimentan un episodio de vulvovaginitis sintomática a lo largo de su vida”*

*“En torno al 40-50% de las mujeres experimentan un segundo episodio de vulvovaginitis sintomática a lo largo de su vida”*

Una de las principales causas de la persistencia y recurrencia de una infección es la dificultad a la hora de detectar potenciales infecciones mixtas.



*Si manifiestas síntomas compatibles con la vaginitis, consulta a tu ginecólogo.*